

## ADMINISTRATION ORALE DES BISPHOSPHONATES\*

<p><b><u>Une fois par semaine :</u></b> alendronate 70 mg risédronate 35 mg</p> <p><b><u>Une fois par mois :</u></b> risédronate 150 mg</p>	
<p><b>Première chose le matin à jeun.</b></p> <p><b>NE PAS</b> administrer avec d'autres médicaments à prendre le matin. Il NE sera PAS absorbé et NE sera PAS efficace s'il est pris après avoir mangé.</p>	
<p><b>Prendre avec un grand verre d'eau.</b></p> <p><b>NE PAS</b> prendre avec du lait, du jus, du café, du thé, etc. Il NE sera PAS absorbé et NE sera PAS efficace s'il est pris après un liquide autre que de l'eau.</p>	
<p><b>Les patients devraient attendre 30 min. (préférentiellement 60 min.) avant de manger ou de boire, y compris d'autres médicaments.</b></p> <p>Il faut du temps avant que le médicament soit absorbé. L'absorption s'arrête lorsque de la nourriture ou d'autres médicaments entrent dans l'estomac.</p>	
<p><b>NE PAS mâcher ou écraser le médicament.</b></p> <p>Le médicament NE sera PAS bien absorbé et peut abimer l'œsophage ou causer des plaies dans la bouche s'il n'est pas pris entier.</p>	
<p><b>Le patient NE DEVRAIT PAS s'étendre après la prise du médicament. Le patient peut s'asseoir, rester debout ou marcher.</b></p> <p>Le patient peut s'étendre 30 min. APRÈS avoir pris le médicament (de préférence 60 min.).</p> <p><b>DANGER</b> : S'étendre après avoir pris ce médicament peut causer un ulcère de l'œsophage qui peut saigner ou se perforer.</p>	

\*Actonel (Actonel DR™) à action retardée DOIT être pris AVEC le déjeuner.